

---

**Bacrocin<sup>®</sup>**  
**mupirocina**

**MEDICAMENTO SIMILAR  
EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO DE  
REFERÊNCIA**

**FORMA FARMACÊUTICA E  
APRESENTAÇÃO**

Pomada com 2% de mupirocina (20 mg/g): Embalagem com uma bisnaga de 15 g.

**USO TÓPICO**

**USO ADULTO E PEDIÁTRICO**

**COMPOSIÇÃO**

Cada grama de Bacrocin<sup>®</sup> pomada dermatológica contém:

mupirocina..... 20 mg  
excipientes: macrogol (polietilenoglicol).

# **INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

## **1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Bacrocin<sup>®</sup> pomada é um medicamento indicado para o tratamento tópico de infecções de pele (como impetigo, foliculite e furunculose) causadas por micro-organismos sensíveis à mupirocina.

## **2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

Bacrocin<sup>®</sup> é uma pomada que contém o antibiótico mupirocina. Como antibiótico tópico (ou seja, para ser aplicado diretamente na pele), elimina germes contaminantes, agindo contra os micro-organismos responsáveis pela maior parte das infecções de pele. Bacrocin<sup>®</sup> pomada começa a fazer efeito assim que você passa a pomada na pele. Consulte seu médico caso não observe melhora

dentro de 3 a 5 dias após o início do tratamento.

### **3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Não use Bacrocin<sup>®</sup> pomada caso você já tenha tido uma reação alérgica à substância ativa (mupirocina) ou a qualquer componente deste medicamento ou a outras pomadas que contenham esses mesmos componentes.

**Não existem contraindicações relativas a faixas etárias.**

### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Bacrocin<sup>®</sup> pomada não é indicado para uso nos olhos, no interior do nariz e nem em áreas da pele onde foram inseridos tubos para inclusão ou retirada de líquidos do corpo, como, por exemplo, cateteres, cânulas. Se precisar usá-lo no rosto, tenha cuidado para que não entre nos olhos. Caso a pomada caia

acidentalmente em seus olhos, lave-os com bastante água até que todo o medicamento seja retirado dos seus olhos.

O polietilenoglicol, um dos componentes de Bacrocín<sup>®</sup> pomada, pode ser absorvido através de feridas abertas na pele e é eliminado pelos rins.

Assim como outras pomadas à base de polietilenoglicol, Bacrocín<sup>®</sup> pomada deve ser usado com precaução em pacientes que apresentam problemas nos rins.

**Em caso de irritação na pele com o uso deste produto, o tratamento deve ser interrompido e o médico deve ser comunicado imediatamente.**

Como os demais antibióticos, o uso prolongado de Bacrocín<sup>®</sup> pomada pode resultar no aparecimento de micro-organismos não-sensíveis (resistentes) ao tratamento.

Em situações muito raras, medicamentos como Bacrocín<sup>®</sup> pomada podem causar inflamação do cólon (intestino grosso), causando diarreia, geralmente com sangue e muco, dor estomacal e febre. Caso você apresente esses sintomas, procure o seu médico imediatamente.

Em pacientes idosos não há restrições do uso de Bacrocín<sup>®</sup> pomada desde que não apresentem problemas nos rins.

### **Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas**

Não se observou nenhum efeito prejudicial sobre essas atividades com o uso deste medicamento.

### **Gravidez e lactação**

Não há informações sobre o uso de Bacrocín<sup>®</sup> pomada na gravidez.

O uso de Bacrocín<sup>®</sup> pomada não é recomendado durante a gravidez ou em mulheres que estejam amamentando.

Se ocorrer gravidez durante ou logo após o tratamento com Bacrocin<sup>®</sup> pomada, o uso deve ser interrompido e o médico comunicado imediatamente.

Não há informações sobre a excreção de Bacrocin<sup>®</sup> pomada pelo leite materno. Portanto, se um mamilo rachado tiver que ser tratado com este medicamento, deve ser cuidadosamente lavado antes da amamentação.

**Este medicamento não deve ser usado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

### **Interações medicamentosas**

Não há relatos sobre interações com medicamentos, alimentos ou exames laboratoriais.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

**5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Cuidados de armazenamento:**

Conservar a bisnaga fechada, manter à temperatura ambiente (15 a 30°C) e proteger da luz.

**Aspectos físicos / Características organolépticas:** pomada de cor branca.

**Ao fim do tratamento, descarte o que restou do produto.**

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe**

**alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **Modo de uso**

Bacrocin<sup>®</sup> pomada deve ser aplicado na região afetada, que pode ser coberta com um curativo que permita a passagem de ar ou não, conforme orientação de seu médico.

Lave suas mãos após a aplicação do produto.

Ao fim do tratamento, deve-se descartar o que restou do produto.

### **Posologia: crianças/adultos/idosos**

Aplicar Bacrocin<sup>®</sup> pomada na área afetada até três vezes ao dia por no máximo dez dias, dependendo da resposta.



**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Se você se esquecer de aplicar sua pomada, aplique-a assim que se lembrar. Depois, continue o tratamento como anteriormente.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

**Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento):** ardência na área de aplicação.

**Reações incomuns (ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento):** coceira; vermelhidão; sensação de agulhadas e ressecamento na área de aplicação; reações de sensibilização na pele à mupirocina ou à base da pomada.

**Reações muito raras (ocorrem em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento):** reações alérgicas generalizadas a componentes da pomada, incluindo anafilaxia (reação alérgica aguda e grave), *rash* generalizado (erupções cutâneas), urticária (placas e coceiras na pele) e angioedema (inchaço sob a pele).

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Ainda há poucos dados com superdosagem de Bacrocín<sup>®</sup> pomada.

### **Tratamento**

Não há tratamento específico para superdosagem de Bacrocín<sup>®</sup> pomada. Em caso de superdosagem, você deve procurar seu médico.

Também é recomendado seguir orientação do centro de intoxicações nacional, quando disponível.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA -  
SÓ PODE SER VENDIDO COM  
RETENÇÃO DA RECEITA.**

® Marca Registrada

M.S. 1.0575.0057.001-8 - Cartucho  
contendo 1 bisnaga com 15 g  
Resp. Técnica: Dra. Andreia Marini -  
CRF-SP nº 46.444

Registrado por:

**Valeant Farmacêutica do Brasil Ltda.**

Alameda Capovilla, 109 - Indaiatuba -  
SP

CNPJ 61.186.136/0001-22 - Indústria  
Brasileira

Uma empresa do grupo

**Valeant Pharmaceuticals  
International, Inc.** - Canadá

Fabricado por:

Instituto Terapêutico Delta Ltda.  
Alameda Capovilla, 129 - Indaiatuba -  
SP

**SAC VALEANT: 0800 16 6116**

e-mail: [sac@valeant.com](mailto:sac@valeant.com)

**Esta bula foi atualizada conforme  
Bula Padrão aprovada pela ANVISA  
em 15/09/2015.**



Embalagem reciclável

4000015980 VA627/D